Guía Informativa sobre PrEP

Compatibilidad con Otros Tratamientos

- **Anticonceptivos hormonales** La PGT no interfiere con parches, implantes, dispositivos intrauterinos ni gestágenos.
- **Tratamientos endocrinos** La PGT no interfiere con tratamientos para tiroides, adrenal ni estrógenos.
- **Laxantes** El magnesio en PGT no interfiere en el efecto de estos fármacos.
- **Lactancia** Se sugiere evitar la PGT durante el periodo de lactancia materna.

Candidatos para PrEP

- **Personas sin VIH** La PrEP se indica en personas con riesgo sustancial de infección.
- **Parejas serodiscordantes** Personas con una pareja infectada con VIH pueden beneficiarse.
- **Grupos de población clave** Hombres homosexuales y bisexuales, trabajadoras sexuales, mujeres transgénero y trabajadores sexuales masculinos.

Efectos Secundarios de PrEP

- **Dolor abdominal** Molestias leves al iniciar el tratamiento.
- **Náuseas** Comunes al principio del tratamiento.
- **Dolor de cabeza** Puede aparecer, pero suele desaparecer pronto.

Seguimiento Médico

- **Primera consulta** Evaluación del paciente, historia clínica y prescripción adecuada.
- **Visitas mensuales** Consultas para evaluar evolución del tratamiento.
- **Visitas trimestrales** Evaluación regular y ajustes si es necesario.

Dónde Obtener PrEP en Honduras

- **Tegucigalpa**
  - Centro de Salud Alonso Suazo
  - Centro de Salud San Miguel
  - Centro de Salud El Manchén
  - Clínica VIH/Sida del Hospital Escuela
- **San Pedro Sula**
  - Centro de Salud Miguel Paz Barahona
  - Clínica Metropolitana / Horizontes
- **Otras ciudades**
  - Clínica VIH/Sida del Hospital Santa Teresa (Comayagua)
  - Clínica VIH/Sida del Hospital General del Sur
  - Clínica VIH/Sida del Hospital Atlántida